

学会や患者会	The Epilepsy Foundation [20]	The Epilepsy Foundation New England [21]	Epilepsy Action [22]	The Epilepsy Society [23]	The BC Epilepsy Society [24, 25]	CURE [26]
てんかんはCOVID-19のリスクを高めますか。	基本的には高めません。	基本的には高めません。	基本的には高めません。	基本的には高めません。	基本的には高めません。	基本的には高めません。
抗てんかん薬はCOVID-19のリスクを高めますか。	いいえ(ただしACTH/ステロイド/エベロリムス/免疫抑制療法を除く)。	-	いいえ(ただしステロイド/エベロリムスを除く)。	いいえ、抗てんかん薬の内服を継続してください。	いくつかの抗てんかん薬はリスクと関連がありません。	ステロイドやエベロリムスを使用している患者さんに注意が必要です。
COVID-19の症状としてけいれん発作はありますか。	一般的ではない。	-	-	-	-	十分な根拠がありません。
てんかんのある人がCOVID-19にかかったら発作は増えますか。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。
他の健康状態の変化に関わらず、発作に変化があったらどうしたらよいですか。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	-	-	-	-	-
てんかんのある人は定期受診をどうしたらよいですか。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	-	-	-	-
人混みを避けるため、遠隔医療は推奨されますか。	-	はい。	-	-	-	-
てんかんの人の突然死(SUDEP)は、COVID-19でリスクがあがりますか。	いいえ。	-	-	-	-	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。
COVID-19にかかったらてんかんのある人はどうしたらいいですか。	-	かかりつけ医療機関に連絡してください。	家にいてください。	家にいてください。	直接医療機関に行かないでください。	-
コロナウイルスのこの状況下で、抗てんかん薬の需要が追いつかない可能性はありますか。	ありません。	-	その可能性は低いです。	ありません。	-	-
てんかんのある人は抗てんかん薬を蓄えておくべきですか。	-	はい、90日分処方してもらいましょう。	-	いいえ。	はい、少なくとも14日分はあることを確認してください。	-
コロナウイルス感染症にかかったら抗てんかん薬はどうすればいいですか。	-	-	他の誰かに抗てんかん薬を代わりにとって来てもらおう頼んでください。	他の誰かに抗てんかん薬を代わりにとって来てもらおう頼んでください。	-	-

学会や患者会	AES (for clinicians) [27]	Young Epilepsy [28]	Epilepsy scotland [29]	First Choice Neurology [30]	Dravet syndrome news [31]	Dravet syndrome UK [32]
てんかんはCOVID-19のリスクを高めますか。	-	基本的には高めません。	基本的には高めません。	-	基本的には高めません。	基本的には高めません。
抗てんかん薬はCOVID-19のリスクを高めますか。	-	エベロリムスやステロイドを使用している患者さんは自己隔離が必要です。	ほとんどの一般的な抗てんかん薬は高めません。	抗てんかん薬の中には骨髄抑制を来すものがあり、注意が必要です。	-	-
COVID-19の症状としてけいれん発作はありますか。	-	-	-	十分な根拠がありません。	-	-
てんかんのある人がCOVID-19にかかったら発作は増えますか。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	-
他の健康状態の変化に関わらず、発作に変化があったらどうしたらよいですか。	-	かかりつけ医療機関に連絡してください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	-	-
てんかんのある人は定期受診をどうしたらよいですか。	-	-	-	-	-	-
人混みを避けるため、遠隔医療は推奨されますか。	はい。	-	-	はい。	-	-
てんかんの人の突然死(SUDEP)は、COVID-19でリスクがあがりますか。	-	-	-	他のウイルス感染症と同じく増える可能性があります。	-	-
COVID-19にかかったらてんかんのある人はどうしたらいいですか。	-	家にいてください。	直接医療機関に行かないでください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	CDCの推奨に従ってください。かかりつけ医療機関に連絡してください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。
コロナウイルスのこの状況下で、抗てんかん薬の需要が追いつかない可能性はありますか。	ありません。	-	その可能性は低いです。	-	-	その可能性は低いです。
てんかんのある人は抗てんかん薬を蓄えておくべきですか。	はい、90日分処方してもらいましょう。	-	-	-	はい、少なくとも数週間分はあることを確認してください。	-
コロナウイルス感染症にかかったら抗てんかん薬はどうすればいいですか。	-	-	かかりつけ医療機関に連絡してください。	かかりつけ医療機関に連絡してください。	-	-